

ဂွန်ဆန်နှင့်ဂွန်ဆန် (ဂျန်ဆန်း) ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆေး

ဂွန်ဆန်နှင့်ဂွန်ဆန် (J&J) ကာကွယ်ဆေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ ငွေရအရပ် ယ်ရောက်ပြီး သူများအတွက် ရရှိသော ဂုဏ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆေး သုံးခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေရစ် တစ်နှစ်တည်းက ထုတ်ရန် ကာကွယ်ဆေး တစ်ခုထက်ပို၍ ပိုမိုနှုတ်ပါသည်။

061321 BURMESE



ရရှိသော ကာကွယ်ဆေးများအားလုံးသည် ဂုဏ် - ၁၉ ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ဘာမကျန်းမှု၊ ဆေးရုံတက်ရမှု နှင့် သင်္ဘောပျက်မှုကို ကျင့်ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်ကောင်းပါသည်။ အားလုံးကုသရန်မရဘဲ ဆေးရုံ ကျွမ်းကျင်သူများက ထိခံ နှုတ်ပြုထားပါသည်။

J&J ကာကွယ်ဆေး တစ်နှစ်ပြည့်အထိ နှစ်ရက် ၂ ပတ် အကဲဖြတ်၍ သင့်အား သင့်အား ကာကွယ်ဆေးရန် အဆင်သင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

ဆေးက လုပ်ဆောင်သည်မှာ

J&J ကာကွယ်ဆေးသည် ဗိုင်းရပ်စ်ကော (viral vector) ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအတွင်း အန္တရာယ်ရှိသည့် အဓိကဗိုင်းရပ်စ် (သာမန်အအေးမိရာဂါဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်) တစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး ယင်းက ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်၏ ဓာတ်ကို ပရိုတန်းမှ ဗီဇတစ်မျိုးကို သယ်ဆောင်ထားပါသည်။ ယင်းက ခွင့်ပြုထားပြီးသော အခြားကာကွယ်ဆေးများ (ဖိုဗား (Pfizer) နှင့် မိုဒါနား (Moderna) တို့ ကဲ့သို့ ကိုဗစ် - ၁၉ ဖြစ်စေသော ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်ကို မှတ်တမ်းတင်၍ တိုက်ထုတ်ရန် သင့်အား သင်ကြားပေးပါသည်။

ဆေးက မလုပ်ဆောင်သည်မှာ

- ယင်းက သင့်အား ကိုဗစ် - ၁၉ သို့မဟုတ် အအေးမိခြင်း မဖြစ်စေပါ။
- ၎င်းက သင်၏ အီအန်အေ (DNA) သို့မဟုတ် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို မပြောင်းလဲစေပါ။
- ထို့အပြင် ယင်းတို့က သားမြိုခြင်း မဖြစ်စေပါ။

ဂွန်ဆန်နှင့်ဂွန်ဆန် ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆေးအတွင်း တာပါဝင်ပါသလဲ။

J&J ကာကွယ်ဆေးများတွင် ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် အချက်အလက်ပါသည့် ပြင်ဆင်မှု မီးဖိုထားသော အဓိကဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုး ပါရှိပါသည်။ ၎င်းတွင် ကာကွယ်ဆေးများကို တည်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းရာ၌ ကူညီပေးသည့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ဆား၊ သကြား၊ နှင့် အခြား အော်ဂဲနစ် ကွန်ပိုင်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။

ကာကွယ်ဆေးထဲတွင် ဥများ၊ အစာမပျက်အာဟာရဓာတ်များ၊ လေးတက်စီ ခေါ် ရာတာ၊ ဝက်သား သို့မဟုတ် အခြား တိရစ္ဆာန် ထွက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် သန္ဓေသားဆဲလ်များ မပါဝင်ပါ။

J&J ကာကွယ်ဆေးစဉ် အသက် ၁၈ နှစ် နှင့် အထက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ အတွက် ဖြစ်ပါသည်

သင်သည် ကိုယ်တိုင်နေပါက သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေပါက၊ ပြင်းထန်သည့် ရောဂါတစ်ခုခုရှိပါက၊ သွေးခဲ သည့် ရောဂါတစ်ခုခု သို့မဟုတ် သွေးကြဲဆေး သောက်နေရပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးခန်းနှင့် ပြောဆိုပါ။



ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ

ကာကွယ်ဆေးထိုးအပြီး၌ လူအတော်များများတွင် ခမ်းပျော့ပျော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိပါသည်။ ယင်းက သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် ၎င်းလုပ်ဆောင်မှုမည် အလုပ် - ရောဂါကို ဆန့်ကျင်၍ အကာအကွယ် ယာဉ်ဆောင်ကိရိတ်ကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြသည့် လက္ခဏာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင့်ထံတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မရှိသည့်ကိုင် ကာကွယ်ဆေးက သင့်ကိုကာကွယ်ရန် အလုပ်လုပ်နေပါသည်။

- ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများထဲတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည့်နေရာ၌ နာကျင်ခြင်း သို့မဟုတ် နီခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပယ်နိုးနိုးမိခြင်း၊ နှလုံးသို့မဟုတ် အဖျားငွေ့ ငွေ့ရှိခြင်း တို့ ပါဝင်ပါသည်။
- အဆိုပါ သွင်ပြင်လက္ခဏာများက ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိပါသည်။ အကယ်၍ မပျောက်ကင်းပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးခန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

