

วัคซีน COVID-19 ของ JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN)

062021 THAI

วัคซีน Johnson & Johnson/Janssen (J&J) เป็นหนึ่งในสามวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการรับวัคซีนมากกว่าหนึ่งชนิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสชนิดเดียวกันนั้น เป็นเรื่องปกติ

วัคซีนทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถป้องกันโรคร้ายแรง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตจาก COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

ร่างกายของคุณจะพร้อมปกป้องตัวเองใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน J&J เพียงหนึ่งเข็ม



วัคซีนนี้จะทำอะไรบ้าง

วัคซีน J&J เป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ประกอบด้วยไวรัสอะดีโนที่ไม่เป็นอันตราย (ไวรัสไข้หวัดธรรมดา) ซึ่งมีชิ้นจากโปรตีนหนามของไวรัสโคโรนา สิ่งนี้จะสอนร่างกายของคุณให้รู้จักและต่อสู้กับไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 เช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต (ไฟเซอร์และโมเดอร์นา)

วัคซีนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง

- ไม่ทำให้คุณเป็น COVID-19 หรือเป็นหวัด
- ไม่เปลี่ยน DNA หรือสารพันธุกรรมใดๆ ของคุณ
- ไม่ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยาก

วัคซีน COVID-19 ของ Johnson & Johnson มีอะไรบ้าง?

วัคซีน J&J มีไวรัสอะดีโนที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งมีข้อมูลจากไวรัสโคโรนารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีส่วนประกอบที่ช่วยให้วัคซีนคงตัว ได้แก่ เกลือ น้ำตาล และสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ

วัคซีนนี้ไม่มีส่วนประกอบของไข่ สารกันเสีย ยาง เนื้อหมู หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ เซลล์จากการกักในครรภ์ หรือไวรัสโคโรนา

วัคซีน J&J จะใช้สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป

ปรึกษากับแพทย์หรือคลินิก หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร มีอาการแพ้อย่างรุนแรง มีประวัติการเกิดลิ่มเลือดหรือรับประทานยาละลายลิ่มเลือด

ผลข้างเคียง

หลายคนมีผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงหลังจากได้รับวัคซีน นี่เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังทำในสิ่งที่ควรทำ นั่นคือการสร้างเกราะป้องกันโรค แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยมีอาการข้างเคียง แต่วัคซีนก็ทำงานเพื่อปกป้องคุณ

- ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ เกิดอาการปวดเมื่อยหรือมีผื่นแดงขึ้นบริเวณที่รับวัคซีน มีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และ/หรือมีไข้ต่ำ ๆ
- อาการเหล่านี้มักจะหายไปเองภายในสองถึงสามวัน หากยังไม่หาย ควรติดต่อแพทย์หรือคลินิกของคุณ



ปัญหาร้ายแรงที่พบได้ยาก

ปฏิกิริยาการแพ้

บางคนมีอาการแพ้วัคซีน COVID-19 ขึ้นรุนแรง แต่พบได้ไม่บ่อย ขอให้ทุกคนรอสักครู่หลังการรับวัคซีนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง เวลาที่รอนี้จะทำให้มีเวลาไปพบแพทย์ หากจำเป็น

ความผิดปกติของสลิมนเลือด

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางและของรัฐได้แนะนำให้ยังคงใช้วัคซีน Johnson & Johnson (J&J) ต่อไป หลังจากหยุดไป 10 วันในเดือนเมษายน 2021 การหยุดชั่วคราวนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เข้าใจถึงความเสี่ยงของการเกิดสลิมนเลือดชนิดหายาก ตามที่ได้มีการรายงานหลังจากมีกลุ่มคนบางส่วนได้รับวัคซีนนี้

ภาวะที่ร้ายแรงคือสลิมนเลือดที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดในสมอง กีบ หรือขา พร้อมกับเกล็ดเลือดในระดับต่ำ (เซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายของคุณหยุดอาการเลือดออกได้) ซึ่งเรียกว่าภาวะสลิมนเลือดอุดตันที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือ TTS ภาวะนี้ร้ายแรงมากและอาจถึงแก่ชีวิต แต่ก็สามารถรักษาให้หายได้เช่นกัน การรักษาจะแตกต่างจากสลิมนเลือดอื่น ๆ

TTS เป็นอาการที่พบได้ยากมาก ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนประมาณ 7 ใน 1 ล้านคนที่อายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปี อาจประสบปัญหาสำหรับผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไปและผู้ชายทุกวัย ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนี้พบได้ยากมากกว่า แม้ว่าจะเคยเกิดขึ้นก็ตาม

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ศึกษา TTS ในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีน Johnson & Johnson ตัดสินใจว่า ประโยชน์ของการได้รับวัคซีน Johnson & Johnson มีมากกว่าความเสี่ยงสำหรับคนส่วนใหญ่ ความเสี่ยงในการเกิดสลิมนเลือดอุดตันหรือเสียชีวิตจากโรค COVID-19 นั้นมากกว่าความเสี่ยงของการเกิดสลิมนเลือดอุดตันและเสียชีวิตจากวัคซีน

ให้สังเกตอาการที่ร้ายแรงกว่านี้เป็นเวลาสามสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน:

- ปวดหัวอย่างรุนแรงหรือปวดหัวอย่างต่อเนื่อง
- ตามัว
- เจ็บหน้าอกหรือปวดท้องอย่างรุนแรง
- ขาบวมหรือปวด
- หายใจลำบาก
- เกิดรอยช้ำง่ายหรือมีห้อเลือดเล็ก ๆ ใต้ผิวหนังรอบนอกจุดที่คุณรับวัคซีน

หากคุณมีอาการเหล่านี้ ให้โทร 911 หรือไปที่ห้องฉุกเฉิน โดยจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รับวัคซีน Johnson & Johnson เพื่อที่จะได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

อยู่อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดในชุมชนของเราและยังไม่มีวัคซีนใดที่ได้ผล 100% แม้ว่าคุณจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม คุณควรล้างมือต่อไป สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เว้นระยะห่างของคุณ และมีการพบปะกันน้อยคนโดยใช้เวลาไม่นานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นที่ได้รับวัคซีนแล้ว

ค้นหา "COVID-19" ทางเว็บไซต์ในเขตของคุณเพื่อรับข้อมูล ภายในพื้นที่

