

如果我接受单克隆抗体治疗, 有何预期?

单克隆抗体疗法使用针头将药液注入静脉(输注)或皮肤下方(皮下)。您的医疗保健提供者或您将接受治疗的地点将说明您将接受哪种治疗。对于这两种治疗过程, 均由训练有素的医疗专业人员使用针头进行。

输注(在您的静脉中)

您必须前往有经过专门培训的工作人员的输注中心, 才能通过输注接受单克隆抗体。

使用针头(静脉内)将这种治疗药液注入您的静脉。完成输注需要20-50分钟, 甚至可能更长。输注后将要求您再等一个小时, 以确保您没有严重副作用。

皮下(在您的皮肤下方)

如果您接受皮下单克隆抗体治疗, 将作四个短针头在皮肤下方四个不同位置注射。这些位置通常包括手臂后部、腹部和/或大腿。注射全部四针大约需要1-3分钟。将要求您在注射后等待一个小时, 以确保您没有严重副作用。

副作用

无论采用哪种治疗, 您都可能在注射部位感到不适。这很常见, 应该会在几天内消失。

有些人可能会出现轻微反应, 其中包括:

- 短暂痛苦
- 轻度出血
- 瘀血
- 疼痛
- 肿胀

这些与您注射其他药物时可能遇到的情况类似, 如Covid-19疫苗或流感疫苗。这些反应可能会持续数日。

如果您注意到注射部位附近出现疼痛、发红、有液体流出、麻木、刺痛或其他相关症状等变化, 请致电您的医疗保健提供者。

罕见过敏反应

这种情况很少见, 但有些人可能会对单克隆抗体治疗产生严重过敏反应。要求每个人都在治疗后至少等待一小时, 以确保没有严重过敏反应, 以便如果需要, 可以立即提供帮助。

其他严重反应

极少数人可能会对治疗产生罕见的严重反应。如果您在治疗后数日内出现以下任何更严重症状，请咨询您的医疗保健提供者或寻求医疗护理：

- 胃部不适（恶心、呕吐或腹泻）
- 瘙痒、肿胀、皮疹或荨麻疹
- 头晕或低血压
- 心跳变化
- 任何新的或恶化症状
- 呼吸困难
- 乏力
- 神志不清

治疗后有何预期

治疗结束后，您应该回家休息并注意您的 COVID-19 症状（如果您有这些症状）。如果您的注射部位感到不适，可以在治疗当天使用冷敷。之后，保温（如加热垫）可以帮助治愈任何瘀伤。

大多数人不需要任何额外后续治疗。如果您的医生认为您应该接受额外治疗，他们会与您沟通。

您可能会开始感觉到自己的 COVID-19 症状迅速改善，或者您可能还需要一段时间才能开始感觉好转。在某些情况下，您可能会遇到 COVID-19 症状恶化。如果您的症状很严重，则应该立即就医，其中包括：

- 呼吸困难
- 持续胸部疼痛或压力
- 新的神志不清状态
- 无法苏醒或保持清醒
- 皮肤、嘴唇或甲床变苍白、灰色或蓝色，具体取决于肤色。

如果您未接种疫苗，则应该在治疗后等待 90 天才能接种疫苗。

有问题可以向谁致电

如果您对治疗有疑问或疑虑，请致电您的医疗保健提供者或您接受治疗的诊所或药房。