

如果我接受單克隆抗體治療，我能夠期待什麼？

單克隆抗體治療使用針頭將藥液注入靜脈（輸液）或皮膚下方（皮下）。您的醫療保健提供者或您將接受治療的地方將會說明您將會接受哪種治療。對於這兩種程序，都會由訓練有素的醫療專業人員使用針頭。

輸液（在您的靜脈中）

您必須前往有經過專門培訓的工作人員之輸液中心，才能通過輸液接受單克隆抗體。

這種治療將使用針頭（靜脈內）把藥液注入您的靜脈。輸液需要 20-50 分鐘或更久才能完成。輸液後將要求您再等待一小時，以確保您沒有嚴重的副作用。

皮下（在您的皮膚下方）

如果您接受皮下單克隆抗體治療，將在您的四個不同身體位置以短針於皮膚下注射四針。這通常包括手臂後部、腹部和/或大腿。注射全部四針大約需要 1-3 分鐘。將要求您在注射後等待一小時，以確保您沒有嚴重的副作用。

副作用

無論採用哪種治療，您都可能在注射部位感到不適。這是很常見的，並會在幾天內消失。

有些人可能會出現輕微的反應，包括：

- 短暫的痛楚
- 輕度出血
- 瘀血積聚
- 疼痛
- 腫脹

這類似於您注射其他藥物時可能遇到的情況，例如 COVID-19 疫苗或流感疫苗。這些反應可能會持續幾天。

如果您注意到注射部位附近出現疼痛、發紅、有液體流出、麻痺、刺痛或其他相關症狀等變化，請致電您的醫療保健提供者。

罕見的過敏反應

這種情況很少見，但有些人可能會對單克隆抗體治療產生嚴重的過敏反應。要求各人在治療後至少等待一小時，以確保沒有嚴重的過敏反應，以便如果需要時立即提供幫助。

其他嚴重的反應

極少數人可能會對治療產生罕見但嚴重的反應。如果您在治療後的數天內出現以下任何更嚴重的症狀，請諮詢您的醫療保健提供者或尋求醫療護理：

- 胃部不適（噁心、嘔吐或腹瀉）
- 瘙癢、腫脹、皮疹或蕁麻疹
- 頭暈或低血壓
- 心跳出現變化
- 任何新的或惡化的症狀
- 呼吸困難
- 乏力
- 神志不清

治療後預期會發生什麼？

治療後，您應該回家休息並留意您的 COVID-19 症狀（如果您有這些症狀）。如果您在注射部位感到不適，您可以在治療當天使用冷敷。之後，保持溫暖（如加熱墊）可以幫助治療任何瘀血積聚。

大多數人不需要任何額外的後續治療。如果您的醫生認為您應該接受額外治療，他會與您聯絡。

您可能會開始感覺到您的 COVID-19 症狀迅速改善，或者您可能需要一段時間才開始感覺好轉。在某些情況下，您的 COVID-19 症狀可能會惡化。如果您的症狀很嚴重，應該立即求診，包括：

- 難以呼吸
- 持續的胸部疼痛或受壓
- 新的神志不清
- 難以喚醒或昏迷不醒
- 蒼白、灰色或藍色的皮膚、嘴唇或指甲的甲床，取決於膚色。

如果您未接種疫苗，您應該在治療後等待 90 天才能接種疫苗。

有問題可以致電給誰

如果您對治療有問題或疑慮，請致電您的醫療保健提供者或您接受治療的診所或藥房。